



## **Критерії безпечного переводу пацієнтів із відділення інтенсивної терапії для подальшого лікування у стаціонарні відділення лікувального закладу**

Переводу у стаціонарні відділення лікарні із ВАІТ підлягають пацієнти стан яких відповідає наступним критеріям:

### **1) З боку центральної нервової системи:**

#### **1.1 Рівень притомності**

- вище 13 балів за ШКГ та при умові відсутності негативної неврологічної динаміки протягом 2 останніх діб (для пацієнтів без первинного ушкодження головного мозку);
- вище 11 балів за ШКГ та при умові відсутності негативної неврологічної динаміки протягом 2 останніх діб (для пацієнтів із первинним пошкодженням головного мозку).
- пацієнти із стійкими або незворотними розладами функції головного мозку.

#### **1.2 Відсутність гострого судомного синдрому протягом 2 останніх діб. (у тому числі корегованого пероральними протисудомними препаратами).**

#### **1.3 Відсутність галюцинозу (якщо це не пов'язано із хронічними психічними розладами), вираженого психомоторного збудження та при можливості корекції ажитації пацієнта з допомогою пероральних препаратів.**

### **2) З боку серцево – судинної системи:**

#### **2.1 Стабільний рівень артеріального тиску (із врахуванням індивідуальних особливостей конкретного пацієнта) без необхідності застосування інфузійної медикаментозної корекції протягом 2 останніх діб або на протязі лікування у ВАІТ.**

#### **2.2 Відсутність гострих порушень серцевого ритму.**

#### **2.3 Відсутність негативної динаміки на ЕКГ.**

### **3) З боку дихальної системи:**

#### **3.1 Вільна прохідність верхніх дихальних шляхів та трахеостомічної трубки (при її наявності).**

- 3.2 Відсутність вираженого тахіпноє або патологічних видів дихання (за виключенням випадків хронічних захворювань дихальної системи, що приводять до стійких порушень)
- 3.3 Відсутність необхідності апаратної респіраторної підтримки.

**3) З боку сечовидільної системи:**

- 3.1 Відсутність клініки гострого пошкодження нирок у стадії олігоанурії.

**4) Інші стани :**

- 4.1 Відсутність ознак клінічно значимої кровотечі, що продовжується.
- 4.2 Відсутність постгеморагічної анемії важкого ступеня.
- 4.3 Відсутність важких порушень водно – електролітного стану.
- 4.4 Відсутність декомпенсованих станів при ендокринних захворюваннях.