



WORLD THROMBOSIS DAY
OCTOBER 13

Шкала оцінки ризику кровотеч у терапевтичних хворих

Decousus H et al. *Chest*. 2011;139(1):69-79.

Факторы риска	ОР (ДИ 95%)	Баллы
Активная желудочно-кишечная язва	4.15 (2.21-7.77)	4.5
Кровотечение в последние 3 мес.	3.64 (2.21-5.99)	4
Снижение количества тромбоцитов < 50 x 10 ⁹ /л	3.37 (1.84-6.18)	4
Возраст ≥ 80 лет	2.96 (1.53-6.15)	3.5
Печеночная недостаточность (МНО >1,5)	2.18 (1.1-4.33)	2.5
Выраженная почечная недостаточность (СКФ <30 мл/мин/м ²)	2.14 (1.44-3.2) 2.5	2.5
Нахождение в БИТ	2.1 (1.4-3.1)	2.5
Центральный катетер	1.85 (1.2-2.9)	2
Ревматическое заболевание	1.78 (1.1-2.9)	2
Рак	1.78 (1.2-2.6)	2
Возраст 40-84 лет	1.48 (1.1-2.0)	1.5
Мужской пол	1.48 (1.1-2.0)	1
Умеренная почечная недостаточность (СКФ 30-59 мл/мин/м ²)	1.37 (1-1.9)	1

< 7 балів – ризик великих кровотеч 0,4%

≥ 7 балів – ризик великих кровотеч 4,1%